

NIEUWSBRIEF VEEHOUDERS JANUARI 2024

Enquête

In december ontving u van ons een enquête over de praktijk. Al velen van u hebben deze ingevuld en ingeleverd, hartelijk dank hiervoor. Hebt u hem nog niet ingeleverd? We ontvangen hem graag alsnog voor een zo hoog mogelijke respons.

Te veel koper in het rantsoen

Om goed te kunnen functioneren heeft een koe voldoende koper in haar rantsoen nodig. Echter, meer is niet per se beter! Sterker nog, een overmaat in het rantsoen leidt tot stapeling in de lever met bijbehorende gezondheidsproblemen.

De afgelopen maanden hebben we bij meerdere bedrijven een probleem met de kopervoorziening in kaart gebracht. In alle gevallen werd er via leverbiopten aangetoond dat de levers - soms extreem - hoge koperwaardes bevatten.

Uitgelicht: Salmonella



Afgelopen najaar bleek uit tankmelkonderzoek dat meerdere bedrijven een omslag hebben gehad. Echter hebben we ook enkele bedrijven gehad die in de laatste ronde gunstig waren maar wel klachten hebben gekregen bij de kalveren (koorts, diarree, sterfte) en koeien (diarree met koorts).

Historisch zien we altijd meer ongunstige uitslagen in het najaar. Meestal ervaren deze bedrijven geen problemen door Salmonella. Waarom we nu relatief meer bedrijven met klachten zien is niet geheel duidelijk.

Salmonella is een mestbacterie die ook in de omgeving voorkomt. Insleep van de kiem gebeurt vaak via aankoop van vee, van mest of ruwvoer. Een andere mogelijkheid is bezoek van derden of ongedierte die besmette mest meenemen.

Bij een besmetting is het meest belangrijk om de verspreiding in de stal te voorkomen. Dit betekent het voorkomen dat een besmette koe de kans krijgt anderen te besmetten. Besmetting gaat altijd via opname van besmette mest (1 gram is al voldoende). Het is daarom extra belangrijk op de hygiëne en looproutes te letten.

Als u denkt thuis klachten te zien als gevolg van Salmonella, neem dan contact op met de praktijk.



Een koe kan een overmaat aan koper in het rantsoen niet goed uitscheiden en slaat dit op in de lever. Wanneer dit te hoog oploopt zal de lever beperkt worden of zelfs helemaal stoppen met functioneren. Dit leidt vaak tot vage klachten, zoals meer uierontsteking, een slechte klauwgezondheid, verminderde productie of minder reactie op behandeling. Een overmaat aan koper kan via het bloed of de melk niet betrouwbaar worden aangetoond. Het nemen van leverbiopten is de enige betrouwbare mogelijkheid. Het nemen van een leverbiopt is een kleine ingreep met weinig risico's en gevolgen voor de koe.

Een overmaat aan koper komt voornamelijk uit het rantsoen. Mocht u twijfelen aan de kopervoorziening, begin dan met een rantsoencheck. Hebt u hierover vragen kunt u contact opnemen met de praktijk.